

CASOS CLINICOS

EMBARAZO Y SIFILIS

CASO 1

- Mujer de 19 años embarazo controlado VDRL + TPHA+ y VIH -.
- Mayo VDRL 16 dils. Pareja VDRL – y VIH – se realiza igualmente 3 dosis en cada uno.
- Junio VDRL 16 y en Agosto 32 dils. Nace el bebe, VDRL 8 dils.
- ¿Qué hace?

CASO 2

- Mujer de 20 años con segunda gesta de otra pareja, se controla en privado el embarazo y trae serologías neg.
- Al ingreso al hospital VDRL 64 y la pareja neg.
- El bebe nace asintomatico con VDRL 16 dils.
- ¿Qué hace?

CASO 2

- Al aplicar primera dosis de penicilina IM a la madre se edematiza y requiere corticoides y adrenalina. Usted le administra un macrolido por 10 días. Eritromicina cada 6 hs.
- Al mes VDRL 32 y a los 2 meses 32, la pareja sigue negativa.
- ¿Qué hace?

CASO 3

- Mujer de 19 años con parto prematuro 32 semanas. 7 días previos primer control del embarazo con VDRL 32 dils. Nace el bebé con VDRL 16 dils. Se medica con ampi + genta por sospecha de sepsis.
- ¿Qué hace?

CASO 4

- Joven de 19 años con embarazo de 26 semanas y condilomas planos en zona anal y vaginal, rash en tronco no pruriginosos o maculopapulares. Antecedentes de VDRL neg en primer trimestre de la gestacion. Ahora VDRL 16 dils. Indica tratamiento con penicilina.
- ¿Cuántas dosis aplica?

CASO 5

- Mujer de 20 años, tercer embarazo, serologías negativas con HIV neg del primer trimestre.
- Se separa de su pareja y vuelven a convivir en el tercer trimestre. Al octavo mes de embarazo se interna por eco alterada, niño con hidrops fetalis. Se realizan todas las serologías y VDRL del bebe 128. fallece SC. La pareja es neg.
- ¿Qué piensa?

CASO 6

- Joven de 18 años segunda gesta, 33 semanas de embarazo, VDRL 256, condilomas vulvares. Resto de serologías negativas. Realiza 3 dosis de penicilina. Control al mes VDRL 128. Nace el bebe.
- ¿Qué hace?