

12 ° CONGRESO ARGENTINO DE PEDIATRÍA SOCIAL
7 ° CONGRESO ARGENTINO DE LACTANCIA MATERNA
Fecha: 6, 7 y 8 de Septiembre de 2012
CORRIENTES

Modalidad: Mesa Redonda
Lactancia en niños con capacidades diferentes

Jueves 6 de septiembre – 09:00 a 10:30

Salón Cine 3

Sede: Complejo de Cines de Cinemacenter
Corrientes - Centro Comercial Carrefour



LACTANCIA MATERNA EN NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES

- Es probable que los padres de un bebé con necesidades especiales experimenten sensaciones de desilusión, enojo, impotencia y culpa. Tal vez tengan que pasar por un período de duelo para renunciar a aquel bebé que imaginaban, y aceptar al que tienen en brazos.


Ejemplos:

- Cardiopatía congénita;
- Labio leporino y paladar hendido;
- Síndrome de Down
- Problemas neurológicos.





CARDIOPATÍA CONGÉNITA




- Los recién nacidos suelen subir de peso más lentamente sin importar el régimen de
- alimentación por el mayor gasto calórico.
- Los estudios han encontrado que la lactancia materna es menos estresante y más eficiente en el aprovechamiento de la energía que el biberón.
- Algunos podrán tomar pecho exclusivo y en otros sus médicos podrían indicar suplementos: si es el caso se puede usar leche materna extraída del final de la mamada, el suplementador de lactancia en vez del biberón, o vaso o cuchara para dar el suplemento de leche materna o fórmula.



CARDIOPATÍA CONGÉNITA



- La necesidad de un suplemento hace que algunas madres cuestionen el valor o el volumen de su leche.
- Aumentar el volumen de leche que el lactante ingiere no es necesariamente la solución más adecuada.
- Como pediatras y las familias han visto que cuando el niño se estabiliza y compensa debido al efecto de los medicamentos (o la cirugía) succionan con mayor eficacia, aumenta la producción de leche y el progreso ponderal es significativo.



LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO

Antes



Después



COMPLICACIONES

- Los niños con labio hendido o paladar hendido tienden a ser más propensos a padecer otitis, a perder la audición y a tener defectos en el habla. Los problemas dentales, tales como caries y dientes faltantes, adicionales, malformados o desplazados, también son comunes en los niños nacidos con paladar hendido.

 ADAM.

LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO

- Es uno de los defectos congénitos más comunes. Afecta a uno de cada 700-750 recién nacidos. El 25% de estos niños padecen de paladar hendido, 25% de labio leporino y el 50% de ambos.

LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO

BENEFICIOS DE LA LECHE MATERNA

- Menos infecciones en los oídos
- Mejor tono muscular de cara y lengua
- Mejor vínculo madre hijo
- Es producto autólogo, menos irritante para las mucosas nasales y vías respiratorias.


DIFICULTADES DE ALIMENTACIÓN

- Ausencia de sello efectivo para la succión.
- Paso de leche a la nariz
- Ahogos
- Irritabilidad del niño ante la dificultad

LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO

SOLUCIONES

- los niños con labio hendido o paladar hendido pueden necesitar usar un paladar protésico llamado **obturador palatino** para poder succionar correctamente.
 - La madre puede aprender a usar el dedo o el mismo pecho para obturar el orificio y hacer de “ventosa”
 - La posición erguida es a menudo más fácil para el bebé con paladar hendido, porque previene que la leche pase a su nariz.
 - Las madres dicen que el agarre invertido (agarre tipo fútbol americano) parece ayudar un poco.
- Cada diada madre hijo es única.
 - Es importante que la posición para dar pecho sea cómoda para ambos ya que van a dedicar muchas horas por día a la lactancia.
 - Cuando la hendidura es extensa la lactancia puede ser muy difícil, si no se logra de todos modos se puede obtener los beneficios de la leche materna por medio de la extracción y el ofrecimiento con biberón con tetinas especiales.



Cuando no se puede amamantar

- Otros pudieran requerir el uso de biberones
- especiales, por ejemplo el biberón Medela/Johnson para labio leporino/paladar hendido, el biberón y la tetina Haberman o la Pigeon.
- Algunos padres dicen que les ha ido bien cuando alimentan al bebé en un asientito de seguridad para automóvil, cuando se les sostiene verticalmente sobre el regazo.

MES DE LA LACTANCIA MATERNA:

Para amamantar a un bebé con fisura labiopalatina



Posición Acostado

ASÍ
NO

Posición de lado o acostado, no es muy favorable ocasionalmente provoca reflujo nasal.



Posición Caballito

ASÍ
SI


Posición vertical o "caballito". Esta técnica, permitirá una adecuada extracción de leche con una deglución sin atragantamiento ni reflujo nasal.

Para mayor información: Teléfono: 4623290 Cel. 943143831 RPM: #943143831


LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO

CIRUGÍA

- Por lo general, se hace una cirugía durante los primeros 3 a 6 meses para reparar el labio hendido y otra entre los 9 y los 14 meses para reparar el paladar hendido. Los dos tipos de cirugía se realizan en el hospital bajo anestesia general.




SINDROME DE DOWN



Defecto de causa genética, con un cromosoma de más en el par 21.

- El médico y profesor español de la Facultad de Medicina de Cantabria, **Jesús Flórez Beledo**, aseguró que “las personas con síndrome de Down tienen que ser autónomas responsables, libres y capaces de desarrollar su vida”.

Cariotipo 47 XY




Lactancia en niños con Síndrome de Down



BENEFICIOS

- Protección contra infecciones y problemas de intestino grueso.
- Mejor coordinación de la boca y lengua.
- Mayor estimulación.
- Mejora el vínculo madre-hijo
- Mejora la autoestima materna.




Lactancia materna en el Síndrome de Down


Condiciones asociadas

- Cardiopatía congénita
- Malformaciones gastrointestinales.
- Ictericia
- Hipotonía muscular
- Cataratas congénitas
- Sordera
- Trastornos endócrinos


Si el recién nacido se interna

- Usar leche materna extraída para dar por sonda, contacto piel a piel y estimular succión del pecho cuando pueda. La hipotonía puede dificultar la succión.
- Ofrecer el pecho con frecuencia
- Despertar y estimular al bebé.
- Asegurarse que esté en buena posición y con apoyo.





Lactancia materna en niños con Síndrome de Down



- POSICIÓN DE DAN-CER
- en esta posición la mamá sujeta a la vez su seno y la mandíbula del bebe, haciendo una U con su mano, de forma que dé apoyo al bebe mientras lacta para que este mantenga el agarre y la succión al pecho.

Lactancia materna y Síndrome de Down

Otras técnicas

- Después de amamantar extraer la leche del final más rica en calorías y administrar con suplementador en la próxima toma, o con cuchara o vaso.

Asesoramiento a padres



Llamá al (011) 4777-7333/6145
o escribinos a asdra@asdra.org.ar




Lactancia en niños con problemas neurológicos

Características que complican la lactancia materna.

- Hipotonía muscular con succión débil e incoordinación succión-deglución
- Hipertonía muscular con tendencia al cierre de la mandíbula y trastornos deglutorios con excesiva reactividad a los estímulos.
- Somnolencia o irritabilidad marcadas.


Técnicas

- Extracción de leche para dar por sonda desde el inicio,
- Estimular el contacto piel a piel lo más pronto posible.
- Estimular los reflejos de búsqueda y succión con el dedo para percibir el tono y la posición de la lengua.
- Envolver y calmar al bebé hipertónico e irritable, puede ser necesario presionar ligeramente la mandíbula del lactante hacia abajo para evitar mordidas.



REFERENCIAS

- Lactancia Materna: Libro de respuestas www.lalecheleague.org por Nancy Mohrbacher (IBLCE) y Julie Stock, BA, (IBLCE)
- Problemas cardíacos: Coombs; Marino; Meier; Riordan; Zeskind, P et al.
- Labio leporino: Lawrence; Danner; Duncan;



GRACIAS

En Misiones visite Cataratas del Iguazú, la séptima maravilla

