Hemangiomas

Comité de Dermatología

Los hemangiomas son lesiones vasculares benignas frecuentes en la infancia. Clásicamente se presentan como una lesion cutánea superficial de color rojo vivo formando una placa o nodulo bien delimitados o tambien pueden ser mas profundos y en este caso mas azulados con limites poco definidos. Las lesiones pueden ser unicas o multiples. Se ven mas frecuentemente en recien nacidos prematuros y son cuatro veces mas frecuentes en mujeres que en varones.

Los hemangiomas pueden estar presentes en el momento del nacimiento, pero mas comúnmente aparecen en las primeras semanas de vida. Presentan tres fases en su evolucion: una de crecimiento rapido que dura entre 6 y 10 meses, otra de reposo en la cual el hemangioma casi no se modifica y finalmente una fase de involución en la cual comienza a desaparecer. Durante la ultima fase pueden desaparecer completamente sin embargo en un 40% de los casos dejan una cicatriz que en general es minima.

Los hemangiomas pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo. En algunas localizaciones como la facial, el cuello y los genitales pueden requerir estudios o cuidados especiales. Se diagnostican mediante el examen fisico y en casos especiales puede ser necesario realizar una tomografía o una resonancia magnetica nuclear.
Los hemangiomas generalmente no requieren tratamiento . La terapeutica esta indicada unicamente en situaciones especiales. El pronostico es excelente en la mayoria de los casos. Aproximadamente el 60% de los hemangiomas habra involucionado a los 5 años de vida, el 75% a los 7 años y el 90 % a los 9 años de vida.

Todas las marcas de nacimiento , incluyendo los hemangiomas deben ser evaluados por el pediatra quien realizara la derivación al especialista cuando corresponda.