



EXAMEN FINAL PRONAP 2023

Clave de Respuestas correctas

PREG	CLAVE	PREG	CLAVE	PREG	CLAVE	PREG	CLAVE
1	C	26	C	51	A	76	C
2	B	27	B	52	B	77	ANULADA
3	C	28	B	53	C	78	A
4	A	29	C	54	B	79	C
5	A	30	A	55	B	80	B
6	A	31	B	56	C	81	B
7	B	32	B	57	B	82	A
8	C	33	B	58	B	83	C
9	B	34	C	59	C	84	B
10	C	35	C	60	A	85	C
11	A	36	B	61	C	86	B
12	B	37	A	62	C	87	C
13	C	38	C	63	A	88	A
14	C	39	C	64	C	89	C
15	C	40	A	65	A	90	B
16	C	41	A	66	B	91	C
17	B	42	A	67	C	92	A
18	B	43	C	68	C	93	C
19	A	44	A	69	B	94	C
20	C	45	C	70	C	95	B
21	A	46	B	71	A	96	A
22	C	47	A	72	B	97	C
23	B	48	B	73	C	98	B
24	A	49	A	74	B	99	B
25	ANULADA	50	B	75	B	100	B

Justificación de respuestas

(Preguntas en las que ha habido un mayor porcentaje de error. En cada una se muestra el porcentaje de acierto)

Pregunta 25. Anulada por defecto técnico.

Pregunta 36. (45,29%)

Pedro, 10 años de edad, es llevado a la consulta ambulatoria por haber presentado cefaleas y tos nocturna entre 5 y 6 veces por semana durante el último mes. Tiene rinorrea acuosa y prurito. Estos episodios son recurrentes en primavera y verano desde los 7 años. No presenta alteraciones del sueño; actividad diaria y escolar normales. En dos oportunidades se diagnosticó sinusitis aguda y fue medicado con amoxicilina-clavulánico, la mejoría fue transitoria. Se sospecha rinitis alérgica.

Al examen físico se observa mucosa nasal pálida, rinorrea acuosa, otoscopía con signos de otitis media con efusión. Además de las pruebas cutáneas: ¿Qué exámenes complementarios son de utilidad para evaluar la magnitud del problema y realizar el tratamiento adecuado?

- a) IgE sérica total, Rx de senos paranasales y cavum, audiometría y rinofibroscopía.
- b) IgE sérica específica, Rx de senos para nasales y cavum, audiometría y timpanometría.
- c) IgE sérica específica, Rx de senos para nasales y cavum, audiometría y espirometría.

La respuesta correcta es b). Porque presenta otoscopía con signos de otitis media con efusión. No es a) ya que la IgE sérica total es un biomarcador de alergia de poca utilidad para el diagnóstico etiológico de la rinitis en la infancia (pág. 52) y no es c) ya que Pedro sólo presenta tos nocturna, sin alteraciones del sueño y actividad diaria y escolares normales. La espirometría no está indicada en este paciente. Estaría indicada en caso de tener disnea con el ejercicio (como en el caso clínico desarrollado en el módulo, pág. 54 y 55).

Pregunta 75. (16,11%)

Francisco, de 5 años de edad, nació con una atresia de esófago con fístula y ha tenido 12 cirugías. Luego de la última, en la que se realizó un ascenso gástrico con unión término-terminal permaneció con ventilación asistida 1 mes y le realizaron una traqueotomía, por lo que no puede hablar. Esto lo tiene muy enojado y se frustra fácilmente.

¿Cómo clasifica la afectación de la función?

- a) De la capacidad.
- b) Del desempeño.
- c) De la estructura.

La respuesta correcta es b). La estructura (laringe y cuerdas vocales) están sanas y Francisco tiene la capacidad de usarlas. Lo que falla es el desempeño porque un niño capaz y con una laringe sana no puede hablar por un procedimiento en la tráquea.

Sería lo mismo que un adulto lúcido y despierto que no puede hablar porque está intubado y ventilado, tiene la capacidad, tiene la laringe sana pero no puede usarla.

Pregunta 77. Anulada por defecto técnico.