



COVID 19: MANEJO EN LA UCIN: RECOMENDACIONES ACTUALES


Comité de Estudios Fetoneonatales
2020

Dra Bossi, Dra Soto Conti, Dr Colantonio, Dra Arbio, Dra Carrascal, Dra.
Casas Cativa, Dra Machado Rea, Dra Nieves

30/04/2020



Manejo del Recién Nacido



Recomendaciones actuales

El clampeo demorado debe seguir siendo el estandar de cuidado debido a su gran impacto positivo.

DEBE IR equipo mas capacitado y entrenado. Los menos posibles. Con Máxima protección

Una vez que el neonato nace: SE PODRIA PONER PIEL A PIEL.

DEBE esta sala tener todo: SI: Servocuna, aire comprimido, o2, y aspiración.

SE PUEDE emplear presión positiva?. Si tiene dificultad respiratoria le administramos PEEP con Neopuff/Bolsa con PEEP y si no responde... se intuba? Si: en esa sala debe estar el kit de intubación. La bolsa TIENE que tener filtro.

SE PUEDE HIGIENIZAR!! Se podria usar jabon neutro con un paño y agua.

Recomendaciones actuales



Identificar, administrar vacuna, vit k y gotas oftálmicas. Se hace en esa sala??? Si: cada servicio definirá dónde.



Una vez finalizado se debe trasladar al neonato desde sala de partos a la UCIN. Siempre en incubadora. Los involucrados en el parto se desvisten EN LA SALA DE PARTOS LUEGO QUE LA MADRE SALE. LO ESPERA OTRO EQUIPO PARA EL TRASLADO.



Podría utilizar incubadoras comunes para el traslado y poder usarla luego para el cuidado. Tener en cuenta si el paciente no requiere O2



En UCIN: cada servicio decidirá donde debe ir ese bebé para ser atendido. Box o habitación, o en la sala respetando mínimo 2 metros entre incubadoras.



Estricto aislamiento de contacto y gota. O sea que la enfermera y el medico deben usar N95.



Este neonato va a ser atendido por una sola enfermera?? Optimizar los recursos humanos.

Recomendaciones actuales



Si presenta dificultad respiratoria: manejo clínico del recién nacido similar al de SDR, evaluar necesidad de presión positiva, SIMV, HFOV, surfactante a dosis habituales y óxido nítrico inhalado.



Se DEBE UTILIZAR VNI: con doble tubuladura (sistema cerrado) con filtro antimicrobiano. Elegir una correcta interfase para un sellado adecuado.



Si es necesaria la intubación endotraqueal, se recomienda que sea llevada a cabo por un profesional experimentado en el manejo de la vía aérea con medidas de protección recomendadas.



Para el circuito de ventilación mecánica, se emplearán filtro antimicrobianos de alta eficiencia en rama espiratoria. Vigilar la condensación que obligará a su sustitución.



Minimizar la aspiración de secreciones que se realizará con sistemas de aspiración cerrado.



El personal expuesto debe ser el mínimo imprescindible.

Recomendaciones actuales

Madre positiva para COVID19

Neonato asintomático: pasará a la habitación con la madre. HOY EL MINISTERIO DE SALUD: SI.

En una habitación común, a dos metros de la madre, con medidas de aislamiento de contacto y de gotas

Control de signos vitales (FC, FR, T^a, TA y Sat. O₂), vigilancia clínica.

Toma de muestras virológicas según protocolo. **NO**

Neonato sintomático

Ingreso a UCIN en aislamiento de contacto y por gotas, es útil el uso de incubadora. Control de signos vitales (FC, FR, T^a, TA y Sat. O₂) y vigilancia clínica.

Muestras de laboratorio: Pruebas de función hepática, función renal, hemograma Proteína C Reactiva, hemocultivos si tiene dificultad respiratoria mas de 6hs con O₂.

Ampicilina/Gentamicina

RX tórax

Toma de muestras virológicas. Según protocolo

Recomendaciones actuales

La alimentación del bebé :

- Recomendaciones para el amamantamiento:
- Promover la lactancia materna y la protección del vínculo madre-hijo. Se le debe explicar a la madre los riesgos y beneficios de la lactancia. Podrá elegir ponerlo al pecho o extraerse leche.
- TODOS LOS SERVICIOS DEBEN OPTIMIZAR EL EQUIPO, RECURSOS, PROCESOS PARA PODER REALIZAR INTERNACION CONJUNTA.
- En caso de que la madre o el neonato tuvieran alguna condición de salud que impidiera el amamantamiento, se evaluará la extracción mecánica de leche para mantener la lactancia materna exclusiva.
- En caso de usar extractor mecánico, se deberá dejar en la habitación para uso exclusivo de la paciente. SEGÚN RECURSOS.