

Dificultades en la atención de Adolescentes con VIH de transmisión vertical



Dr. Eduardo Rubinstein

**Hospital Muñiz
División Pediatría
Adolescencia**

Adolescentes con VIH de TV

Edad (n° 101)

12-13 años	28 adol.	27.8%
14-15 años	39 adol.	38.9%
16-17 años	21 adol.	20.8%
> 18 años	13 adol.	12.5%
Total	101 adol.	100%

Adolescentes con VIH de TV



Sexo (n° 101)

Femenino	48 adol.	47.5%
Masculino	53 adol.	52.5%
Total	101 adol.	100%

Adolescentes con VIH de TV

Familia nuclear Fallecidos o ausentes

Padre y Madre	51	50.5%
Madre	16	15.7%
Padre	18	18.1%
Ambos vivos	16	15.7%
Total	101	100%

Adolescentes con VIH de TV



Clasificación del CDC (n° 101)

A1+A2+B1+B2	65 adol.	64,3%
A3+B3+C3	36 adol.	35,7%
Total	101 adol.	100%

Adolescentes con VIH de TV

Tratamiento ARV (n° 101)

Sin tratamiento	8	7.9 %
1 Esquema	21	20.8%
2 Esquemas	45	44.6%
3 Esquemas	16	15.8%
4 o + Esquemas	11	10.9%
Total	101	100.0%

Adolescentes con VIH de TV

“Diagnóstico de infección por VIH de transmisión vertical en la 2ª década de la vida”

- **Al 30/04/06 se habían atendido 67 adolescentes mayores de 10 años con infección por VIH de TV.**
- **De los cuales 11 (16.4%) fueron diagnosticados después de los 10 años.**
- **En 6 (54.5%) se realizó a partir del diagnóstico materno.**
- **En 7 (63%) habían presentado previamente infecciones asociadas a inmunodeficiencias.**

Adolescentes con VIH de TV

Enfermedades sugestivas de inmunodeficiencia



- **Linfoadenopatías Generalizadas Permanentes**
- **Infecciones bacterianas: recurrentes y más graves (Neumonías, otitis, abscesos)**
- **Candidiasis Oral**
- **Leucoplasia Velloso**
- **Estomatitis herpética recurrente**
- **Dermatitis seborreica**
- **Herpes zoster monometamérico**

Adolescentes con VIH de TV

Enfermedades sugestivas de inmunodeficiencia.

- **Púrpura trombocitopenica**
- **Hepatomegalia**
- **Esplenomegalia**
- **Talla baja. Retraso pondoestatural con o sin desnutrición**
- **Diarrea, recurrente o crónica**
- **Fiebre de origen desconocido (> 1 mes)**

Adolescentes con VIH de TV

Enfermedades sugestivas de inmunodeficiencia.



Laboratorio:

- Elevación de transaminasas
- Anemia. Leucopenia. Trombocitopenia
- Hipergamaglobulinemia (IgA)
- Proteinuria

Adolescentes con VIH de TV



Adolescentes con enfermedad crónica

- **Multi y transgeneracional**
- **Retraso del desarrollo**
- **Discriminación**

Dificultades en la atención

Desde el Equipo de Salud

- **Cambios en la relación profesionales/paciente/familia**

Antes del VIH:

Enfermedad Aguda: episodio único

A partir del VIH:

Enfermedad crónica:

1º Etapa: Acompañarlos hasta la muerte

2º Etapa: Ayudarlos a vivir con ella

- **Problemática familiar y social**
- **Dilemas éticos**

Dificultades en la atención

Desde la Familia



- **Mecanismo de reacción:**
 - Culpa**
 - Negación**
- **Dificultades económicas y laborales**
- **Problemática de los hermanos negativos**

Dificultades en la atención

Desde el Paciente

- **Pérdida o enfermedad de la madre y/o el padre y/o los hermanos**
- **Discriminación. Aislamiento**
- **Falta de proyecto de vida**
- **Trastornos psicológicos**
- **Dificultades en la Escolaridad:**
 - Menor rendimiento**
 - Mayor esfuerzo**

Objetivos a lograr



- **Autocuidado**
- **Adherencia al tratamiento**
- **Inserción familiar y social**
- **Proyecto de vida**

Como hacemos para tratar de alcanzarlos



- **Crear un vínculo**
- **Develamiento**
- **Interdisciplina**
- **Comunicación:**
 - ✓ **Mail y Chat**
 - ✓ **Celular y Mensajes de texto**

Como hacemos para tratar de alcanzarlos



- **Internación abreviada programada**
- **Grupos de Autoayuda**
- **Payamédicos**
- **Comité de Ética**



MUCHAS GRACIAS!

erubin@intramed.net.ar