

## Guía de práctica clínica: Alergia a picadura de himenópteros en pediatría: actualización de 2017

*Guidelines for Clinical Practice: Hymenoptera sting allergy in children: 2017 update*

Comité de Alergia e Inmunología

### RESUMEN

Las picaduras por himenópteros son frecuentes en la infancia. La mayoría producen reacciones locales, consecuencia de un mecanismo inflamatorio, no alérgico, no tienen progresión y se resuelven con simples medidas terapéuticas.

Las reacciones más extensas, generalmente, están asociadas a mecanismos alérgicos, mediados por inmunoglobulina E. Su máxima expresión, la anafilaxia, presenta síntomas cutáneos, respiratorios, cardiovasculares, digestivos y/o neurológicos, con riesgo de muerte. La prevalencia de anafilaxia en pacientes con mastocitosis sistémica es más alta.

La familia *Hymenoptera*, que incluye hormigas coloradas, abejas y avispas, es la causante de las picaduras de mayor riesgo, potencialmente fatales.

Los pilares del diagnóstico son la historia clínica, la identificación del insecto, y las pruebas diagnósticas cutáneas y/o *in vitro* interpretadas por el especialista en Alergia e Inmunología. La inmunoterapia con veneno es el tratamiento de elección para prevenir reacciones anafilácticas por picaduras de himenópteros.

**Palabras clave:** himenópteros, alergia, anafilaxia, inmunoterapia, mastocitosis.

<http://dx.doi.org/10.5546/aap.2017.S91>

**Cómo citar:** Comité de Alergia. Guía de práctica clínica: Alergia a picadura de himenópteros en pediatría: actualización de 2017. *Arch Argent Pediatr* 2017;115 Supl 5:S91-S98.

## Las humanidades en la medicina: un camino para reflexionar acerca de la práctica clínica

*Humanities in Medicine: a road to reflect on clinical practice*

Subcomisión de Humanidades

### RESUMEN

La medicina de hoy produce insatisfacción en los pacientes y en los profesionales. La queja fundamental es la dificultad del encuentro. Este escenario no permite abarcar la experiencia de los pacientes, de los familiares e incluso de los propios médicos que deben enfrentar la frustración y el agotamiento. La subcomisión de Humanidades de la Sociedad Argentina de Pediatría nace como consecuencia de esta preocupación y toma este tema desde una perspectiva humanística. El espíritu de este grupo es el de generar un espacio institucional para la producción de contenidos, apuntando a promover la sensibilización e incorporación de recursos que prioricen la calidad humana en la práctica profesional.

Este artículo busca reflejar la primera actividad realizada en el 37 Congreso Nacional de Pediatría de 2015: el sustento teórico, el desarrollo de sus objetivos y la participación activa de la audiencia.

**Palabras clave:** humanidades, medicina narrativa, desgaste profesional, comunicación en salud.

<http://dx.doi.org/10.5546/aap.2017.S99>

**Cómo citar:** Subcomisión de Humanidades. Las humanidades en la medicina: un camino para reflexionar acerca de la práctica clínica. *Arch Argent Pediatr* 2017;115 Supl 5:S99-S104.

## Colecho en el hogar, lactancia materna y muerte súbita del lactante. Recomendaciones para los profesionales de la salud

*Bedsharing at home, breastfeeding and sudden infant death. Recommendations for health professionals*

Subcomisión de Lactancia Materna y Grupo de Trabajo de Muerte Súbita e Inesperada del Lactante

### RESUMEN

El Grupo de Trabajo en Muerte Súbita e Inesperada del Lactante, junto con la Subcomisión de Lactancia Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría, elaboraron nuevas recomendaciones sobre la práctica del colecho, en la cual el niño duerme en la misma superficie junto a su madre, situación que es motivo de controversia. El colecho favorece la lactancia materna, que, a su vez, es protectora de la muerte súbita del lactante. Un pequeño grupo de niños presenta mayor riesgo de muerte súbita del lactante y accidentes fatales durante el colecho en ciertas circunstancias, que incluyen dormir en un sillón o sofá, padres fumadores, ingesta de sedantes, drogas y/o consumo de alcohol, niños prematuros y/o de bajo peso. El colecho en niños alimentados con leche humana, sin los factores de riesgo mencionados y con padres responsables de implementar un ambiente de sueño seguro, no aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante.

Esta guía no recomienda taxativamente la prohibición del colecho. Instruye a los profesionales de la salud a propalar a las familias un mensaje balanceado que incluya tanto los riesgos como los beneficios del colecho, lo que les permite a los padres una decisión informada al respecto. El documento señala que la cohabitación sin colecho es el lugar más seguro para los bebés al momento de dormir.

**Palabras clave:** muerte súbita del lactante, lactancia materna, colecho, cohabitación.

<http://dx.doi.org/10.5546/aap.2017.S105>

**Cómo citar:** Subcomisión de Lactancia Materna y Grupo de Trabajo de Muerte Súbita e Inesperada del Lactante. Colecho en el hogar, lactancia materna y muerte súbita del lactante. Recomendaciones para los profesionales de la salud. *Arch Argent Pediatr* 2017;115 Supl 5:S105-S110.

Textos completos como Suplemento de Archivos Argentinos de Pediatría, en formato electrónico, en su sitio web (véase sección "Suplementos")