

## Presentación del nuevo caso clínico

En el próximo número se publicará el diagnóstico, manejo y tratamiento de este caso.

Niña de 7 meses de vida que fue evaluada por primera vez en el Consultorio de Clínica Pediátrica del Hospital derivada por el Servicio de Dermatología, donde se encontraba en seguimiento desde sus primeros días de vida por presentar lesiones en la piel. Fue producto de un embarazo controlado, nacida a término, con un peso adecuado para la edad gestacional. Cesárea por falta de progresión. Sin antecedentes familiares de relevancia.

En esta primera consulta en el Servicio de Pediatría, se constató, al momento del examen físico, la presencia de pápulas y nódulos de consistencia duro-elástica, indoloros ante la palpación y con bordes netos, bien circunscriptos (*Figura 1*). La mayoría de las lesiones eran rosadas, eritematosas, algunas blanquecinas, como esclerosadas. Otras mostraban un centro amarillento y, en menor cuantía, telangiectasias en la periferia. Estaban localizadas en la región malar derecha, la nariz derecha, el pabellón auricular izquierdo, la región cervical izquierda, el tórax izquierdo, múltiples en el dorso, el hombro derecho, las manos, la cadera derecha,

en los miembros inferiores y en la región vulvar. Las de la mano y la vulva impresionaban en regresión.

En el interrogatorio, la madre mencionó que las primeras lesiones evidentes se encontraban a nivel facial y estaban presentes al nacer, motivo por el cual, durante la internación conjunta, le habían sugerido que realizara una consulta ambulatoria con Dermatología. Asimismo, relató que, en el transcurso de estos meses, algunas habían ido aclarándose o adoptado formas diferentes y que otras nuevas habían ido apareciendo.

El resto del examen físico se encontraba dentro de los límites normales. Tenía un peso en el percentilo 50 y talla en el percentilo 25-50, y el desarrollo neuromadurativo era acorde a la edad.

### ¿Cuál es su diagnóstico?

- Xantogranuloma juvenil.
- Histiocitosis de células de Langerhans.
- Molusco contagioso.
- Miofibromatosis infantil.
- Tumoración vascular.

FIGURA 1. Lesiones cutáneas diseminadas



Para poder votar ingrese a: <http://www.sap.org.ar/archivos>